

DISSERTA
INAU

SCAR
ET EJU

ANN ENT
TI J. J. TATT

D. GEORGI

ACADEMIA EDINB

EXCELSIOR SENATUS

VERUM FIDELI FACULT

Pro Sta

ACADEMIA IN MEDICIN

RITE ET LEGIS

EXCELSIOR

GEORGI

ARTIS OBSTETRICIAE

KALENDS AUGUSTI, A

EDINB

EXCELSIOR

MDCCL

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
SCARLATINA
ET EJUS SEQUELA;
QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,
D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.
ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;
NECNON
AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU, ET
NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

Pro Gradu Doctoris,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

GEORGIUS PEARSE,

Hibernus,

ARTIS OBSTETRICIÆ NOSOCOM. DUB. PERMISSUS.

KALENDIS AUGUSTI, HORA LOCOQUE SOLITIS.

EDINBURGI:
EXCUDEBAT P. NEILL.

MDCCCXXIII.

To James Woodford with the
assent of the Author.

VIRO EXIMIO
ANTONIO MANN, M. D.

CORCAGIÆ
ARTIS MEDENDI PERITISSIMO,
NECNON,
BENIGNITATE ET MORUM SUAVITATE
INSIGNI,
OMNIBUSQUE VIRTUTIBUS,
QUIBUS
HOMO VEL MEDICUS ORNARI POTEST,
PRÆDITO ;

HOC OPUSCULUM,
PROPTER
PLURIMA BENEFICIA, VERÆQUE AMICITIÆ
TESTIMONIA,
SÆPE IN EUM COLLATA,
(PIGNUS QUIDEM PEREXILE),
SACRUM ESSE
VULT
AUCTOR.

What dire necessities on every hand
Our art, our strength, our fortitude require !
Of foes intestine, what a numerous band
Against this little throb of life conspire !
Yet science can elude the fatal ire
A while, and turn aside Death's level'd dart ;
Sooth the sharp pang, allay the Fever's fire,
And brace the nerves once more, and cheer the heart,
And yet a few soft nights and balmy days impart.

BEATTIE.

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
SCARLATINA
ET EJUS SEQUELA.

GEORGIO PEARSE Auctore.

MIMI proposui, in his paginis, de Scarlatina tractare, morbo contagioso qui epidemicus fatalis grassatur, et ætatem florentem, cui sæpius incidit, ad mortem præmaturam perducit.

Merito hoc malum medicorum attentionem occupavit, ex quo tempore primum in Europa apparuit, anno ut fertur MDCIV, quum LUDOVICUS MERCATUS, PHILIPPI Hispaniæ Regis medicus, historiam ejus conscripsit. Deinde in omnes Europæ terras dispersum est, visumque in

Britannia anno MDCLXXXVIII ibique pestis instar sævivit. Tum cum Rubeola confundebatur: Doctor FOTHERGILL Cynanchen Ulcerosam appellavit, et Doctor COTTON sub nomine Scarlatinæ descripsit.

Diu inter medicos disceptatum est, sitne hic morbus idem atque Cynanche Maligna, an diversus. Non animus est, in arenam de ea re descendere, cum multi et celeberrimi viri possent in utramque opinionem adduci; at mihi, si fas est quæ censeam proferre, morbos omnino diversos nec varias tantum ejusdem formas esse videntur. Quam sententiam confirmant scripta SYDENHAMI, SAUVAGESII, et clarissimi CULLENI, cujus verba sunt: "In all the instances I have seen of what may be called the Scarlet Fever, the disease, in almost every person affected, has been attended with an ulcerous sore throat. This view of the matter may create some doubt; but I am still of opinion, that there is a scarlet fever which is a disease specifically different from the cynanche maligna."

Hi morbi valde diversas habent curandi indicationes: ideoque in animo est solummodo de Scarlatina Simplicis, et Scarlatina Anginosa dicere.

DE NATURA MORBI.

MORBUS contagiosus est, quia veneno peculiari originem trahit; etiam ægri contactu, inoculatione, inspiratione propagatur. Raro cuivis sæpius quam semel per totam vitam incidit. Doctores tamen GREGORY, HEBERDEN, alique dixerunt sibi contigisse videre, quia hoc morbo iterum laborarent; at contendunt Doctores WITHERING CLARKE, et CURRIE non posse fieri, ut eundem bis afficiat.

Juvenes utriusque sexus, præcipue debiliores, infestat.

O Death, why arm with cruelty thy power,
And spare the idle weed, yet lop the flower !

Sed interdum totas familias corripuit, senes pariter ac juniores. Ex mente Doctoris HEBERDEN infantes duos annos nondum nati, vetulæque rarissime ab ea affectantur. Scarlatina plerumque sub finem autumnii vel apud initium hiemis obvenit, sed nulla anni tempestate desunt ejus exempla.

CAUSÆ PRÆDISPONENTES.

HÆ sunt cœli vicissitudines subitæ; ex aëre calido et sicco in frigidum, vel humidum, mutatio; debilitas e variis causis, ut morbo prægresso, vel fatigatione, diæta tenui et nimis parca; quibus adnumerare licet, in aëre impuro habitationem; corporis immunditiam; statumque ætheris peculiarem, et qui verbis definiri non potest.

De natura hujusce contagionis nihil certi cognoscitur; nullos edit effectus ultra paucos ab ægro passus. Quamdiu in corpore deliteat minime constat; affirmat Doctor HEBERDEN se vidisse morbum apparere post diem tertium, quartum, vel quintum postquam aliquis infectioni obiectus fuerat. Non minime mirandum est contagionem communicari, non modo dum morbus adest, sed etiam ad diem usque decimum, ex quo omnia symptomata recesserint.

CLASSIFICATIO ET SYMPTOMATA.

In Classe *Pyrexiarum* et Ordine *Exanthematicum*, in Nosologia CULLENI, ponitur Scarlatina.

Species sunt duæ: sequentia verba habet prima, nempe :—

Scarlatina (Simplex) nulla comitante cynanche.

Altera :—

Scarlatina (Cynanchica) cum cynanche ulcrosa.

Scarlatina Simplex.

Scarlatina Simplex, cum signis solitis pyrexiae incipit, nimirum, lassitudine, debilitate, languore, anxietate, nausea et vomitu; adsunt quoque rigores, dolor capitis, et lumborum, mentisque aberratio, et sub vesperem omnia symptomata ingravescent. Circa diem secundum rubra apparet efflorescentia super cutem, maculis per exiguis intertincta, quæ præcipue in facie et cer vice videtur, et die tertio vel quarto in universum corpus diffunditur, coalescentibus maculis, at febre haud omnino remissa. Hoc tempore

fauces et nares rubri sunt, nec tamen ulcerati ; a die quarto usque ad septimum in squamulas parvas a facie decidit efflorescentia ; manuum epidermis in laminas magnas separatur ; et partes infra positæ relinquuntur tenerrimæ. Pulsus, præsertim dum cutis rubet, celer et durus ; ictusque inter centum, et centum et quadraginta, in sexagesima horæ parte edit.

Media lingua albida est, rubri margines. Delirium mite nonnunquam oritur. Urina limpida et pallida est ; diaphoresis erumpit, qua omnia signa levantur ; calor minuitur, pulsus plenior et validior fit, desquamatio continuatur, cuticula in squamulas furfuraceas abiens, cito renovatur ; et æger in pristinam sanitatem resurgit.

Scarlatina Cynanchica vel Anginosa.

Febris, ut supra, in forma simplice descripsi, in hac perstat, sed multo gravior ; oppressio præcordiorum, nausea et vomitus, tremores artuum cum calore ardente alternantes, dolorque capitis tendens usque ad lumbos, ægrum maxime vastant : languor et debilitas magis urgent ; et dum caput et truncum graviter incommodat calor,

manus et pedes contra frigoris sensus vexat ; musculi colli, maxillæ inferioris, rigidi sunt, nec possunt exerceri sine magno incommodo. Pulsus celer et durus est ; delirium nocte appropinquante urgens, mane decedens, alvusque pertinaciter adstricta. Manent tamen quædam signa adhuc enarranda, quæ genus hoc et constituunt, et distinguunt. Secundo enim vel tertio die ex quo morbus incepit, prodit in cutem efflorescentia, colore coccineo, et in congeries colligata : sensus angustiae in faucibus existit, cum difficultate deglutitionis ; lingua sicca et rubra ; sitis urgens ; et, ex pharyngis inspectione, inflammatio multaque tumefactio super velum pendulum palati et tonsillas videntur ; et membranam mucosam tegunt complures vesiculæ albæ, quæ coalescentes ulcera profunda efficiunt, et liquorem acrem effundunt. Brevi tempore usque ad membranam Schneiderianam serpit inflammatio, et cutem circa nasum labrumque superius defricat. Glandulæque parotidæ et submaxillariæ tument, et saliva copiosè fluit. Tertio vel quarto efflorescentiæ die, lingua rubra est, papillæ tumescunt, et pellicula abraditur, faucesque sordibus fuscis teguntur. Eruptio dissimilis est illi quæ in sim-

plice apparet : maculae super cervicem et thoracem diutius persistunt : calor major est praecipue cutis, et molestior, quasi ex acuum punctura ; et deinde tumescentia ita augetur ut surditas, ob clausam tubam Eustachianam, efficiatur, et vox rauca fiat et fere amissa.

Nonnunquam in junioribus, aeris faucium secretio in ventriculum fluit, diarrhoeam tenesmumque gravissimum excitat : ac, per anum effluens, eutem circum ejus extremitatem excoriat ; pulsus parvus et debilis fit ; aeger noctem insomnis absumit ; vigiliae succedit coma, cum magna debilitate. Saepe bronchiae, vel aliqua e visceribus abdominis inflammantur : et omnia signa ingravescent, donec mors benigna vitae tam miserandae finem tandem imponat.

Si haec infausta absint, inter dies septimum et decimum, sudor erumpit ; cutisque eruptio gradatim evanescit ; desquamatio, cum caloris immutatione, succedit ; tumores faucium dissipantur ; cutis rubor in colorem fuseum abit ; ulcera foeda mitescent, sanumque pus secernunt, et cito evanescunt. Attamen Scarlatinae formam vel mitissimam non raro sequitur Anasarca. De qua re fusius posthae dicendum erit.

DE DIAGNOSI.

SCARLATINÆ similitudinem gerunt morbi complures, præsertim quos Exanthematum ordini subjecit CULLENUS, nempe Variola, Rubeola, Roseola, et Erysipelas.

In Variola, febris eruptiva plerumque gravissima est; non ante diem quartum vel quintum apparet eruptio; at, priusquam videtur, sub cute quasi grana tenuissima arenæ, tangenti percipiuntur. In Scarlatina cutis ab initio rubet; die secundo vel tertio efflorescentia, cum difficultate deglutitionis, occurrit; et cum eruperit, febris haud levatur. Post diem quartum eruptio variolides discrimen facit, adeo manifestum, ut supervacuum sit plura de eo dicere.

Inter rubeolam et scarlatinam haud levis momenti est, in primo statu discernere, cum curationes longe diversas exigant. In illa raro ante diem quartum, nunquam ante tertium prodit efflorescentia; deinde in maculis rubris, distinctis, elatis, circumscriptis, et tactui asperis apparet. Cutis rubor non lucidus sed purpureus est; efflorescentia in forma semilunarum colligitur: in scarlatina, ut supra dictum est, aliter res se habet.

Adest in rubeola coryza, sternutatio, tussis rauca, cum excreatione muci acris; palpebrae tument, oculi rubri sunt, sed non lucem refugiunt.

In Roseola febris plerumque adeo levis et fugax est, ut vix possit cum Scarlatina confundi: sub primum vesperem cutis colore roseo suffunditur, qui dies solummodo duos vel tres permanet; non contagiosa est hæc affectio, nec calor multum, uti semper in Scarlatina, augetur.

Erysipelas, in omnibus partibus corporis, post operationes chirurgicas, vulnera, vel stimulantia cuti admota, videtur accidere. Ubi a causis provenit quæ systema generale afficiunt, maxime super faciem, crura et pedes apparet; partes quæ laborant tumidæ sunt, cum sensu gravitatis et dolore ardente; rubor circumscriptus est, tarde prorepat, et antequam recedat, ad colorem subflavum sensim vergit.

Quum species Scarlatinæ de quo loquimur multum a Cynanche Maligna differt, non difficilis erit diagnosis. Hanc ostendit febris typhoides cum pulsu parvo et debili, magna virium immutatione, spirituque foetido. Adsunt faucium ulcera, quæ nigra crusta teguntur; qua sublata, partes sub ea positæ gangrænosæ reperiuntur. Quæ signa simplex forma nunquam exhibet.

DE PROGNOSE,

Quo Scarlatina formæ simplicis propinquior, eo magis fausta est. Sed ubi febris gravis est, urgentque cynanches anginosæ symptomata, augeatur periculum : sed multum ab ætate, viribus et sexu ægrotantis, multum quoque a natura epidemici existentis pendebit ; juvenes et debiliores utriusvis sexus, fœminæ præsertim, sævitiae ejus difficilius obstant.

Ubi pulsus et calor non multum urgent ; capitisque dolor, dyspnœa et inflammatio pharyngis absunt ; cum febris levis est, simul cum eruptione recedens ; si sudor mitis erumpit ; atque imprimis si vis corporis non minuitur ; optima quæque prædicere licet.

Quæ ingratam faciunt prognosin hæc sunt ; febrisurgens, cum pulsu duro et abnormi ; calor statum naturalem valde superans, (quippe qui in hoc morbo sæpe ad gradum 105^{um} vel 107^{um}, et etiam usque ad 112^{um} * Fahrenheitii surgit) ; molestia ægri cum vespertino paroxysmo ingravescens ; efflorescentia citro retropulsa ; vel diarrhœa oriens difficile sistenda.

* CURRIE.

RATIO MEDENDI,

Consilia medendi præcipua sunt.

1mo, Ineuntem febrem moderare vel ita minuire ut terminatio cito inducatur.

2do, Ubi status excitationis recesserit, symptomata quæ sequuntur mitigare, irritationesque amovere.

3tio, Post febris remissionem, vires ægri medicamentis tonicis sustinere.

Denique, Affectiones, quæ in sequela occurrunt, depellere : quarum *Anasarca* princeps est.

Scarlatina simplex inter morbos mitissimos est, utpote quæ vix unquam periculosa sit, si apud initium curam alvo præbeamus, ut, cathartorum leniorum exhibitione, regularis fiat ; si calor corporis lavatione aqua frigida, diæta tenni potuque subacido minuatur, et si ægri cubiculum aëre puro refrigeretur. Ubi gravior est forma simplex, eadem remedia, quæ in Scarlatina Anginosa, indicantur ; de quibus nunc agitur.

Affusio Frigida.

NULLA hodie inter medicos dubitatio est, quin affusio frigida in hac aliisque exanthematis exhi-

beri debeat ; et cum cutis calor, in hujusce morbi excitatione, (quæ per dies tres vel quatuor primos semper adesse videtur), altius quam in ullo præterea morbo assurgit, haud absurdum est putare, plurimum beneficii ex ejus usu proventurum. Ubi adsunt calor ardens, pulsus celer, et cutis ruberrima, cum sensu anxietatis magnæ, lingua sicca, sitique urgente ; ager in dolium immitti debet, et aqua frigida inter gradus 48^{um} et 52^{um} Fahrenheitii, in eum libere effundi : deinde, probe siccatus, in lectum imponendus est. Cutis calorem et ariditatem minuit, sudorem mitem inducit, sitim quoque restinguit, actionemque pulsus auctam ad statum natural^{em} propriorem reduc^{it}~~et~~ ; et, irritatione sic depulsa, somni desiderium incidit. De hac Doctor BATEMAN, “ it is not only the most effectual febrifuge, the ‘ febrifugium magnum,’ but it is the only sudorific and anodyne that will not disappoint the expectation of the practitioner.” Si calor iterum revertat, necesse erit remedium hoc sæpius per diem, fortasse ad quintam vel sextam vicem, repetere. Post diem tertium affusio vix et ne vix quidem febrem abrumpit ; at semper utilis est ad gravitatem ejus mitigandam : ubi cutis madescit et fauces ulceribus teguntur, de

usu hujus remedii ambigitur; si adsit debilitas, et æger a lecto suo moveri non possit, magis convenit, ut corpus aqua frigida, vel cui acetum sit admixtum, lavetur. Aqua frigida hoc modo applicata effectus suos edere videtur, æque calorem morbosum e corpore abstrahendo, tum systema generale conquassando, quo magis ad cutis perspirationem aptetur: minuit etiam cordis et arteriarum actionem. Cum recesserit status excitationis, post diem tertium vel quartum, affusio aquæ a gradu 98° ad 102^{um} Fahren. calefactæ, potius erit; quæ irritationem mitigare, sudoremque inducere, observatur.

Sanguinis Missio.

IN Scarlatina simplice rarissime opus est detractione sanguinis; at in anginosa nuper medicorum attentionem sibi attraxit; et procul dubio multum sæpe proficit, cum morbus remediis solitis, purgantibus scilicet et affusioni, cedere recusarit, nempe cum febris gravis est caput maxime afficiens, et hydrocephalus formidatur, vel si inflammatio in tracheam vel pulmones tendat.

Tumor faucium vel hirudinibus vel epispasti-

cis subsidit, et vix scalpelli opus deponit. Sanguis per durationem febris detractus semper crusta coriacea tegitur. Si calor cutis nunquam augeatur, nec pulsus unquam acceleretur, et si : ulcera faucium fœda sint, venæsectio inutilis erit vel etiam injuriosa ; semperque in memoria tenendum est, depletionem in sequela hujus morbi necessariam fore, ideoque caute ab initio esse usurpandam.

Purgantia.

OLIM multum melior medicorum pars de usu purgantium dubitavit ; metuebant enim ne debilitas induceretur ; at tandem observationes Doctoris J. HAMILTON utilitatem eorum in hoc et in aliis morbis, in quibus antea neglecta sunt, comprobarunt. Nunc bene noscitur quanti intersit alvum liberam servare ; quod, cum affusione, in multis exemplis sufficit, et alia remedia supervacanea reddit. Adstrictis intestinis, optimum medicamentum invenitur plenum catharticum ex submuriate hydrargyri, et pulvere convolvuli jalapæ ; quod, nisi alvus plene respondeat, post paucas horas repetendum.

Cavendum autem est ne diarrhœa occurrat ; et, si accidat, medicamentis astringentibus cito

reprimi debet. Ab omnibus admittitur usum purgantium prohibere, ne accedat hydrops vel morbi inflammatorii, qui nonnunquam inter convalescentiam oriuntur. Si morbus levis est, purgantia mitia (qualia sunt sales neutrales, vel infusum sennæ), subinde adhibita, ut alvus laxa teneatur, sufficiunt.

Emetica.

MEDICAMENTA quæ vomitum excitent in initio morbi laudantur, quippe quæ cursum ejus abscindant; si primo vel secundo die exhibeantur, proficiunt ventriculum exonerando, præcipue si adsit nausea, et interdum in morbi progressu proderunt, secretionem viscidam removendo quæ in pharynge accumulatur, et recepta in intestina, diarrhœam gravem excitat. Cautè tamen adhibenda sunt, ne mobilitas ventriculi vel debilitas augeatur.

Gargarismata.

MATERIA acris quæ in faucibus colligitur, emundari debet, ulceraque nitidari, collutoriis quibusdam sæpius quotidie adhibitis; et in junioribus, qui nequeunt gargarismata solito more

sumere, fauces debent ope syphonis lavari. Hoc consilio usurpatur, aqua cum acido muriatico, infusum Rosæ Gallicæ, cum pauxillo acidi sulphurici, vel infusum corticis cinchonæ cum vino rubro; at si humor acerrimus sit, gargarisma ex tinctura Capsici annui utilius repertum est.

Supra de Scarlatina Simplicie monui, ut aër purus in tentorium ægri admittatur, lectusque stragulis levibus tegatur; quæ etiam in forma graviori necessaria sunt. Non cibo animali nec aliis rebus stimulantibus vesci debet; potu acidulato utendum est, et fructibus acidis (veluti succo Citri medici fructuque tamarindorum condito) vel acidis mineralibus. Medicamenta tonica per statum febrilem, et (nisi debilitas insolita oriatur) donec efflorescentia evanuerit, prohibenda. Vires deinde ope corticis cinchonæ in forma pulveris reficeantur; infantibus qui eam devorare non possunt, infusum ejusdem vel decoctum melius convenit. Vinum caute adhibendum est, ne actione inflammatoria aucta, morbus iterum ingravescat; cibus facilis concoctu ex juseculo animali et vegetabilibus farinaceis, ad vires reficiendas, concedi potest.

DE SEQUELA.

AFFECTIONES inflammatoriæ præcipue huic morbo succedunt, sive sanguinis ad partes quasdam corporis determinationes; cujus generis sunt Phrenesis, dolores Rheumatismo similes, de quibus hujus opusculi fines nihil amplius dicere sinunt, nisi quod solitis remediis cedant.

Majoris momenti est Anasarcam considerare, quæ sæpissime Scarlatinam sequitur. Ejus quoque causa est actio inflammatoria (sub-acutam dicunt), qua vasa exhalantia stimulantur ad liquorem tenuem in telam cellulosam effundendum, nonnunquam per totum corpus, sed plerumque in faciem et extremitates inferiores; vel in cavitates magnas, comitantibus Hydrocephali, Hydrothoracis, vel Ascitis indicibus. Hæ affectiones incerto tempore apparent, nunc post paucos dies, nunc in sexta vel septima hebdomade.

Pulsus plerumque celer et parvus est; sitis^c urgens; urina parca et colore rubro; vexant etiam dyspnœa capitisque dolor.

Curatio.

ATTENTIONEM medicorum excitavit Doctor ABERCROMBIE ad usum venæsectionis in isto hydrope depellendo; qui ex ipsa origine depletionem postulare videbatur: cujus utilitatem comprobarunt multorum medicorum testimonia.

Morbus cum levis est, sæpe purgantibus et diureticis cedit. Symptomatis præcipue dyspnœæ ingravescentibus, sanguinis, pro ætate ægrotantis, abstractio extemplo solamini crit. Pulsus quoque plenus et mollis fit, urina antea parca, nunc copiosa fluit, medicamenta diuretica bene agunt, et sensus oppressionis generalis amovetur. In iis qui nondum annum quartum vel quintum complevere, præstantius est paucas hirudines temporibus aliisve locis, prout res exigere videatur, applicare; sed, in iis qui hanc ætatem transierint, sanguinis detractio est nunquam negligenda.

Secundum Doctorem J. HAMILTON, purgantia ad curationem perficiendam sufficient: ex his, combinatio pulveris Convolvuli jalapæ vel Aloës socotorinæ, cum submuriate hydrargyri, multum laudata est; et, purgantium leviorum usus, per aliquid temporis postquam malum recesscrit, ad-

hiberi debet. Ubi effusio occurrit, medicamenta diuretica indicantur; eorum Scillæ maritimæ et Digitali purpureæ, cum submuriate hydrargyri, maxime fidendum est; sed in delectu multum a judicio medici pendebit. Ad accelerandam convalescentiam, cibus lautus, aër rusticus, medicamenta tonica, cinchona et acida mineralia, conferunt.

Jam ad finem meæ historiæ perventum est, quam, ut potui, adumbravi; et quoniam voluntas minime defuit, ignoscatis quæ fortasse commiserim, neve negligentiae aut incuriae attribuat.

FINIS.

CORRIGENDA.

- Pag. 2. lin. 12. *pro* videntur. *lege* videtur.
— 12. — 21. — *Afusio* — *Affusio*
— 13. — 14. *lege* statum naturalem propriorem reducit ;
— 18. — 19. *pro* situs *lege* sitis

hiberi debet. Ubi effusio occurrit, medicamenta diuretica indicantur; eorum Scillæ maritimæ et Digitali purpureæ, cum submuriate hydrargyri, maxime fidendum est; sed in delectu multum a judicio medici pendebit. Ad accelerandam convalescentiam, cibus lautus, aër rusticus, medicamenta tonica, cinchona et acida mineralia, conferunt

FINIS.

